DEKSTAL: Samenvatting protocol

ALGEMEEN: - *Klimaat*: Temperatuur dekstal: 18 - 21°C en geen tocht

- *Licht*: Lichtintensiteit: 100/150 lux - lichtregime: constant 16-18 licht/24 uur
- *Management:* **Noteer STEEDS de dag en tijdstip van**; spenen, begin en einde bronst, 1ste en 2de inseminatie, welke beer, tijdstip van terugkomen en eventuele opmerkingen
- *Conditie:* Beoordeling door wegen, conditiescore en/of spekdiktemeting. Beperk gewichtsverlies tot 12% (3-4mm spek). Gelten bij werpen 210 - 220 kg en als 1ste worps zeug ± 170-180 kg bij insemineren. Sterk conditieverlies tijdens lactatie geeft een langer interval spenen-bronst, verlaagd ovulatiegetal, minder kwalitatieve eicellen en stijging embryonale sterfte. **Bronst overslaan bij sterk vermagerde zeugen = noodmaatregel**
- *Voer:* Na spenen tot insemineren: Hoog voerniveau met flushvoer. Ad libitum; minimum 4 kg lactatievoeder. Na insemineren: hoog genoeg voeren om de vruchten te behouden. 30% boven normale schema: 3.3 -3.6kg/dag
- *Huisvesting: Zeugen individueel huisvesten en geen beer permanent in de dekstal. Huisvest te dekken en pas gedekte zeugen apart.*

GELTEN: Correcte aanvoer en opfok! De hele adaptatie moet minimaal 8 tot 12 weken duren. Voor eigen opfok dient een goede selectie te gebeuren. Bronststimulatie in opfok vanaf 5 a 6 maanden. Bronstcontrole vanaf 180 dagen. Introductie gelten in dekstal: >145 kg en >240 dagen oud en best 2-3 x berig geweest. Spek; 13-15 mm.

ZEUGEN: Conditie van de zeug is bepalend voor de fertiliteit. Streef naar een goede verdeling van pariteiten, voorkom kreupelheid.

BEREN: Goede zoekbeer is minimaal 11 maanden oud met goed libido, moet hevig ruiken, grommen, kwijlen en interesse tonen in de zeugen

BRONST: Stimulatie en controle. Stimulatie door direct beercontact 2 x 15 min /dag (kort en intensief). Controle best 2 x daags met beer op vaste tijdstippen. Maar beter 1 x goed dan 2 x half werk.

INSEMINEREN: Insemineer NOOIT na de bronst en zet de beer voor de zeug tijdens inseminatie.

Het volledige protocol vindt u bij: ardol.nl > onze producten > Lianol Ferti > "Download de dekstal checklijst"

Checklijst Fertiliteit

Per 100 zeugen	Doel	Niveau wanneer actie nodig is
Aantal gelten continue beschikbaar voor inseminatie	6	4
Leeftijd 1ste inseminatie in dagen	220-240 (+/- 10)	Niet meteen probleem als conditie goed is: 140 kg 17mm spek: hoe vroeger productief hoe meer biggen tijdens levensduur
Aantal productieve zeugen	100	95
Interval spenen - 1ste ins.	5	10 zeugen met SBI >10
% regelmatige terugkomers	5	6 >15 waarvan 2/3 regelmatig
% onregelmatige terugkomers	2	5
Niet productieve dagen/zeug	12	14
% abortus	<1	>4
% niet drachtige zeugen	1	>2
% uitval drachtige zeugen	<1	>2
Afbigpercentage	89	85
Vervanging %	36	45
Pariteit bij vervanging	6	8
Uitval % kraamstal	10	12
Aantal zoekberen	5	4
% doodgeboren biggen	5	7
% mummies	1	1,5