

A. Gebruiksaanwijzing kraamstal



I - Welke biggen?

- Alle biggen en alle tomen direct na geboorte.

II - Wat te doen direct na geboorte

- los 100g BASDIAR op in 1L water (lauw 30°C).
- Begin met 200ml per toom en vul stelselmatig bij naargelang opname.
- Al roerend uitvoeren want product zakt snel uit.
- Gebruik schone materialen.

III - Wat te doen vanaf dag 2 tot dag 7

- Voer het aangeboden volume op tot max. 1L/toom/dag.
- Steeds minimaal 1 cm water bovenop aangeboden oplossing.
- Al roerend uitvoeren want product zakt snel uit.
- Het dagelijks reinigen van de kommen is niet nodig tot dag 7 (Microbiologisch veilig product).

IV - Wat te doen vanaf dag 7 tot dag 10

- Stelselmatig inmengen van vast voer in de basdiar oplossing.
- Dag 7: 80%-20% Dag 8: 50%-50% Dag 9: 20%-80% Dag 10: 100%vast voer.
- Dagelijks vers voer aanbieden! (vroeg - veel - vaak)
- Aandacht voor het drinknippeldebiet.

(Basdiar niet in de leidingen van voersysteem voor zogende biggen voeren. (Nutrix, TeWe, BD ... - wel in de voerkom)

